



GHPSO CREIL
Boulevard Laennec
60109 CREIL
CEDEX

TEST D EPREUVE INSULINE EN HJPED

Ref : A-D-044

Version : 02

Applicable le : 19-07-2023



ETIQUETTE PATIENT A COLLER

POIDS :
TAILLE :

Date de l'examen :

Nom de l'IDE :

Nom du médecin :

Service:

DEROULEMENT	Temps (min)	T -30	T0	T15	T30	T45	T60	T90	Codes enregistrement LABO
	Heure effective								
Glycémie tube gris		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	CYCGS + CYCOR
Cortisol tube vert		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
GH tube jaune		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	ATRAN + X_1447 (à congeler) X_8693 (à congeler) X_255 cong après centrifugation à 4°
IgF1 tube jaune		☐							
ACTH tube rose (tube spécial à venir chercher au labo et à descendre rapidement)			☐						PROA
Prolactine tube vert			☐						
INSULINE ORDINAIRE IVD, dilué dans 1ml de NaCl à 0,9% à la dose de: ⇒ 0,1 U/kg si poids > 15kg ⇒ 0,075 U/kg, et/ou si risque d'insuffisance surrénale, et/ou si craniopharyngiome et/ou si risque d'hypoglycémie annoncé par le médecin (0,125U/kg ou 0,15U/kg à discuter si IMC > 25 ⇒ Soit.....unités, après les prélèvements de T0 et seulement si glycémie "lecteur" ≥ 2,2mmol/l ou 0,4g/l			Si glycémie ≥ 2,2mmol/l ☐ Puis rincer						
Glucose à 30% 20ml en IVD en 2 min uniquement en cas de malaise (sauf si < 20kg 1ml de G 30% par kg)									
Fréquence cardiaque (mn) au T0 et si malaise important scope	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
TA au T0 et si malaise important	⇒	⇒							
Glycémie "lecteur" en g/l ou mmol/l	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
Effets secondaires : signes d'hypoglycémie, faim, soif, malaise, sueurs, pâleur, tachycardie, fatigue, sensation de chaleur, signes d'endormissement, tremblements, bâillement, grincements de dents									
Faire manger dès la fin de l'épreuve (après les prélèvements et l'injection du glucose 30% au T90)									