



Etiquette patient

Noter UF si différent de l'étiquette

Nom prescripteur :

Nom préleveur :

RENSEIGNEMENTS:

Empty box for patient information.

Empty box for prescriber name.



Date de prélèvement obligatoire

Grid for date of collection (day, month, year).

Heure de prélèvement obligatoire

Grid for time of collection (hour, minute).

FNCDEM

Prélèvement de contrôle demandé par le laboratoire

Rajout d'analyses sur Bilan du / / à h

HEMATOLOGIE: 1 tube EDTA mauve

Electrophorèse de l'hémoglobine + test de falciformation + numération [ELHB1]

HEMOSTASE SPECIALISEE :

THROMBOSE :

Indications de prélèvements:

- A distance de l'évènement thromboembolique idéalement. (Baglin T BJH 2010, 149 : 209-220.)
- A distance des traitements anticoagulants : L'héparine perturbe le dosage de l'AT et les recherches d'ACC pour le PTT
Les AVK perturbent le dosage de la Protéine C et Protéine S, et les recherches d'ACC (faux positifs).
- Au moins 3 à 6 mois après l'accouchement pour doser la protéine S.
- 1 mois après l'arrêt de la pilule pour protéine S et l'AT

Renseignements cliniques :

- Fausse couches à répétition, AVC, Fausse couches, Embolie pulmonaire, Antécédents de thrombose, Femme enceinte : Semaine d'aménorrhée : ..., Phlébite, Autres: ..., Antécédents familiaux, Post partum

Traitements

- Pas de traitement anticoagulant, AVK, Anticoagulants oraux ACO, Héparine (Héparine sodique ou calciparine), Drgaran, Arixtra, Argandea

SPECIMEN

BILAN DE THROMBOSE GLOBAL (comprend ATIII, PC, FV) pour les femmes enceintes + PS pour les autres) 6 tubes citratés bleus de 2,7ml

Demande de thrombose [THRO1]

DEMANDE DE DOSAGE ISOLE : 1 citratés de 2,7 ml ou 3 si > 2 analyses-

- Antithrombine III [ATIII] (Sauf femme enceinte et post-partum), Protéine C [PACT], Protéine S [PS], Facteur V muté [X_1173], Facteur II muté [X_1170], Recherche anticoagulant circulant [ACC] 3 tubes citratés bleus de 2,7ml, Consentement OBLIGATOIRE + 2 tubes EDTA mauves de 6 ml ou 4 tubes EDTA mauves de 3 ml

BIOCHIMIE SPECIALISEE

MARQUEURS TUMORAUX : tube sec jaune

- ACE [ACE], CA 199 [CA199], PSA libre/total [PSALT], AFP [AFP], NSE [NSE], BETA2MICROGLOBULINE [B2MSG] 1 tube sec jaune, CA 125 [CA125], CYFRA [CYFRA], CA 153 [CA153], PSA Total [PSAT]

PROTEINES SPECIALISEES 1 tube sec jaune

- Profil immunité humorale: IgA, IgG, IgM [IGAM], Alpha 2 macroglobuline [A2M], Compléments C3 et C4 [C3C4], Apo A1 [APOA1], Cryoglobuline [CRYO] PRENDRE RDV avec le LABORATOIRE (poste 6813 Creil/ 7024Senlis)

ELECTROPHORESES :

- Electrophorèse (+/- immunofixation) [ELSG1] 1 tube sec jaune, Dosage de chaînes légères libres sériques [CHLSG], Electrophorèse et immunofixation des protéines urinaires y compris TPU [ELUR] Ech des urines de 24h, Volume recueilli pour 24H: en ml

CONTEXTE DE LA DEMANDE (dysglobulinémie ou autre) :

PARTIE RESERVEE LABO

PAS D'HORODATAGE

PAS DE CONSENTEMENT:

Horodatage:



TESTS SPECIFIQUES

Fibrotest[FIBRO] (GGT, BiliT, Apo A1, Hapto, A2 macroglobuline) 1 hépariné vert avec gel + 1 sec jaune avec gel)

Cycle nyctéméral du cortisol [CORS] Noter Heure 1er plvt entre 8h et 9h:.....Heure 2ème plvt entre 16h et 17h:.....

AUTRES TESTS ET EPREUVES
Conserver les tubes jusqu'à la fin du test
1 seul test par BON.

Les protocoles des tests se trouvent sur le site Intranet du laboratoire

Dates des dernières règles: Inconnue

PRODUIT administré :

SPECIMEN

Noter les différentes heures de prelevement ainsi que sur les t

T-15	T0	T+15	T+30	T+60	T+90	T+120	T+.....	T+.....

- Test au Synacthène immédiat [SYNIM] Tubes héparinés
- Test LHRH [LHRH] Tubes héparinés
- Test au Pimpéran métoclopramide [METOP] Tubes héparinés
- Hyperglycémie Provoquée [HGPO] Tubes fluorés gris
- Test de freinage à la dexamethasone [DECT] Tubes héparinés
- Cycle glycémique [CYCGS] Tubes fluorés gris

PARTIE RESERVEE AU LABO